

La martre

Martes martes (MUSTELIDES)



LA MARTRE

Son pelage est brun, dense et soyeux ; elle a une queue touffue et aussi une tâche blanche sur sa gorge.


La martre vit dans les massifs montagneux et dans les forêts d'altitude. Elle établit son domicile dans un arbre creux.




HABITAT DE LA MARTRE

La martre a en moyenne 1 à 3 petits chaque année. Son prédateur est l'Aigle royal. Elle est également chassée par l'homme pour sa fourrure.

La martre mange des insectes, des fruits, des rongeurs et d'autres petits Mammifères (ex : écureuils).



LA MARCHÉ DE LA MARTRE




PATTE ARRIÈRE GAUCHE

Matthieu, Julie


Le renard

Vulpes vulpes (CANIDES)



Le renard a un pelage roux brun. Le bout de ses pattes est noir ainsi que le bout de ses oreilles. Il peut aussi être observé en Lozère, dans les Alpes, dans les Pyrénées.


LES EMPREINTES



Le renard se déplace au pas ou au trot. On peut différencier l'empreinte du renard à celle du chien : chez le renard, on peut tracer une ligne horizontale et deux obliques sans couper les traces de pelotes, alors que chez la plupart des chiens, cela est impossible.

Le renard est un animal des milieux boisés et des montagnes.

Il vit dans un terrier. Celui-ci lui sert de gîte pour se reposer. Le terrier est divisé en plusieurs parties : la chambre, les toilettes...



LE TERRIER

Arnaud, Léo



Sentier pédagogique des Gorges de la Jordanne

Mais quelle est cette empreinte ?





Travail réalisé par des élèves de 5^{ème}

Le blaireau

Meles meles (MUSTELIDES)


Le blaireau est un animal surtout nocturne.

Il se nourrit de vers de terre, d'insectes (coléoptères, larves de guêpes), de mollusques (escargots), d'amphibiens mais aussi de graines, de fruits et de champignons. Le blaireau est donc omnivore.




EMPREINTE DE PATTE ANTERIEURE DROITE

Le blaireau vit dans un terrier, creusé avec ses pattes. Le terrier comporte plusieurs galeries et des puits de ventilation. Les murs sont recouverts de feuilles et de mousse.



LE TERRIER




Alexandre, Kévin

La loutre

Lutra lutra (MUSTELIDES)

Il existe plus de 13 espèces de loutre différentes. Les femelles loutres sont moins lourdes et plus petites que les mâles.

La loutre se nourrit de poissons mais aussi d'amphibiens, de crustacés et de petits oiseaux.



Le terrier de la loutre se trouve sous l'eau et le plus souvent sous la terre. La plupart du temps, il présente une sortie sur terre et une sortie sous l'eau.



PALMURE



PATTE PALMÉE

La loutre possède des pattes palmées qui lui permettent de nager. La patte arrière est plus petite et plus ovale que la patte avant. Entre les pattes avant et les pattes arrière il y a environ 45 cm pour une loutre adulte.


La palmure des pattes ne s'imprime que très rarement.

Fabien, Paul


Le chevreuil

Capreolus capreolus (CERVIDES)

Le chevreuil peut mesurer jusqu'à 80 cm de haut et 135 cm de long. Le chevreuil se déplace en faisant surtout des bonds (qui peuvent atteindre 8m!).





Le chevreuil adulte possède des cornes (plus petites que celles du cerf). Son pelage est brun avec une tâche blanche bien visible au niveau de l'arrière train. Ses oreilles sont fines et pointues.



A la belle saison, le chevreuil se nourrit d'herbes et de champignons. L'hiver, il se satisfait de ronces.

Le petit du chevreuil s'appelle le chevreuillard et non le daim!

Le chevreuil et le daim sont deux espèces différentes : le daim est plus petit et ne présente pas de tâche blanche sur l'arrière train.



L'empreinte correspond à celle des sabots. Elle est de petite taille, sa forme étroite et allongée est caractéristique.

Alexis, Kévin